

Vragen?

Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn kan u steeds bij het verplegend personeel terecht, wij helpen u graag verder.

We wensen uw kind een spoedig herstel toe.

*Afdeling Pediatrie O.L.V. Ziekenhuis Waregem
Bronvermelding: bau, belgian association of urology*

Contact

Telefoonnummer kinderafdeling: 056/ 62 31 70

Secretariaat pediatrie: 056/ 62 35 50


Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11



Infobrochure
KINDERGENEESKUNDE

Auteur: Dienst Kindergeneeskunde
Publicatiedatum: September 2023
Doc: 5829

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be



Circumcisie (besnijdenis)

Behandeling van fimosis of parafimosis / besnijdenis van de voorhuid

Geachte ouder(s),

Er wordt bij uw zoon een circumcisie (besnijdenis van de voorhuid) uitgevoerd, om één van de volgende redenen:

- Fimosis: dit is een voorhuidvernauwing. Hierdoor is het terugschuiven van de voorhuid over de eikel van de penis moeilijk of onmogelijk, waardoor het hele gebied niet grondig kan worden gereinigd. Zo kunnen zich tussen de voorhuid en de eikel bacteriën ophopen, met terugkerende infecties tot gevolg.
- Parafimosis: hierbij kan de teruggeschoven voorhuid niet meer terug. Dit gaat meestal gepaard met ernstige pijn en zwelling van de voorhuid. Een parafimosis moet zo snel mogelijk worden teruggetrokken om blijvende schade aan de eikel te voorkomen. Om herhal te vermijden wordt een circumcisie uitgevoerd.
- Om religieuze of rituele redenen.

Waaruit bestaat de ingreep

Voor deze ingreep wordt een dagopname gepland. Uw zoon moet zich die dag nuchter aanmelden. Dit betekent vanaf middernacht voor de operatie niets meer eten of drinken, ook geen water.

De ingreep zelf gebeurt onder algemene verdoving, en eventueel een caudaal block. (Dit is extra lokale verdoving, zodat uw kind geen pijn voelt de eerste uren na de operatie.) In de recovery wordt telkens pijnstilling gegeven voor uw kind terug naar de kamer gaat.

Tijdens de ingreep wordt de voorhuid volledig verwijderd om de eventuele vernauwing weg te nemen. De operatie gebeurt meestal zonder complicaties, en leidt meestal tot een goed cosmetisch resultaat.

Na de ingreep blijft uw zoon nog een tweetal uren nuchter. Dan wordt door de verpleegkundige water aangeboden, wat later een yoghurt.

Indien er zich geen problemen voordoen, mag uw zoon in de loop van de namiddag of avond, na controle door de arts, terug mee naar huis.

Nazorg na de operatie

MEDICATIE: PIJNSTILLING

- perdolan® of dafalgan® volgens gewicht, maximum 4 x per dag.
- Indien onvoldoende: tussendoor nurofen® of malafene® volgens gewicht, maximum 3 x per dag

HYGIËNISCHE ZORG

- Kort douchen mag vanaf de 2^{de} dag, maar niet baden gedurende 1 week.
- Een strakke onderbroek dragen, waarbij de penis naar boven wordt gebracht, om de zwelling tegen te gaan.
- Niet sporten (ook niet zwemmen) gedurende 1 week.

WONDZORG

- Lokale zwelling is normaal en verdwijnt spontaan na enkele dagen
- Dagelijkse wondcontrole, en terra- cortril® oogzalf aanbrengen ter hoogte van de hechtingen 1 a 2 maal per dag.
- De hechtingen verteren vanzelf na 3-6 weken

VOEDING

- Op de dag van de operatie licht verteerbare voeding

AANDACHTSPUNTEN

- U wordt opgebeld de dag na de operatie door een verpleegkundige.
- Bij een van de volgende signalen moet u meteen een arts raadplegen: pijn bij het plassen of moeilijk plassen, verandering van urinegeur, hoge koorts, bloeden.
- Uw zoon moet op controle komen, na afspraak met de arts.