

## Vragen?

Indien er nog verdere vragen of opmerkingen zijn kan u steeds bij het verplegend personeel terecht, wij helpen u graag verder.

**We wensen uw kind een spoedig herstel toe.**

*Afdeling Pediatrie O.L.V. Ziekenhuis Waregem  
Bronvermelding: bau, belgian association of urology*

## Contact

Telefoonnummer kinderafdeling: 056/ 62 31 70

Secretariaat pediatrie: 056/ 62 35 50

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11



Infobrochure  
KINDERGENEESKUNDE

Auteur: Dienst Kindergeneeskunde  
Publicatiedatum: September 2023  
Doc: 5832

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem  
Vijfseweg 150  
8790 Waregem  
T. 056/ 62 31 11  
F. 056/ 62 30 20  
E. info@ziekenhuiswaregem.be



Hydrocele  
communicans  
liesbreuk

# Behandeling van een liesbreuk of hydrocele communicans

## Geachte ouder(s),

Er wordt bij uw kind een chirurgische ingreep uitgevoerd, omdat een liesbreuk of een hydrocele communicans werd vastgesteld.

Tijdens de embryologische ontwikkeling (tijdens de zwangerschap) dalen de teelballen bij jongens vanuit de buik naar de balzak. De teelbal sleept het buikvlies met zich mee, zodat de teelbal uiteindelijk omgeven is door een klein zakje met zeer weinig vocht. Nadat de teelbal door het lieskanaal is ingedaald, moet de verbinding met het buikvlies zich sluiten. Indien dit niet volledig gebeurt, kan er vocht uit de buikholte naar de balzak lopen. Dit noemen we "hydrocele communicans". Er treedt dan een meestal pijnloze zwelling op van de balzak. Een hydrocele communicans kan soms spontaan sluiten tot de leeftijd van 1 jaar.

Als de verbinding met de buikholte breder is, kan er vet of darmweefsel indalen. Dit noemen we een liesbreuk. In zeldzame gevallen kan een ingeklemde liesbreuk ontstaan, waarbij de darm in de breukpoort gekneld raakt. Een dringende ingreep is dan nodig.

Ook bij meisjes kan een liesbreuk voorkomen. Het betreft een pijnloze zwelling in de liesstreek die steeds leidt tot een chirurgische ingreep.

## Waaruit bestaat de ingreep

Voor deze ingreep wordt een dagopname gepland. Uw kind moet zich die dag nuchter aanmelden. Dit betekent vanaf middernacht voor de operatie niets meer eten of drinken, ook geen water.

De ingreep zelf gebeurt onder algemene verdoving, en eventueel een caudaal block. (Dit is extra lokale verdoving, zodat uw kind geen pijn voelt de eerste uren na de operatie.) In de recovery wordt telkens pijnstilling gegeven voor uw kind terug naar de kamer gaat.

Tijdens de ingreep wordt een incisie gemaakt in de liesstreek. De verbinding wordt zo hoog mogelijk naar het buikvlies afgebonden. Als er een brede breukopening bestaat wordt deze met hechtingen vernauwd, zodat er zich geen nieuwe liesbreuk ontwikkelt. De operatie gebeurt meestal zonder complicaties.

Na de ingreep blijft uw zoon nog een tweetal uren nuchter. Dan wordt door de verpleegkundige water aangeboden, wat later een yoghurt.

Indien er zich geen problemen voordoen, mag uw kind in de loop van de namiddag of avond, na controle door de arts, terug mee naar huis.

## Nazorg na de operatie

### MEDICATIE: PIJNSTILLING

- perdolan® of dafalgan® volgens gewicht, maximum 4 x per dag.
- Indien onvoldoende: tussendoor nurofen® of malafene® volgens gewicht, maximum 3 x per dag

### HYGIËNISCHE ZORG

- Kort douchen mag vanaf 48u na de ingreep, maar niet baden gedurende 1 week.
- Niet sporten (ook niet zwemmen) gedurende 1 week

## WONDZORG

- Lokale zwelling is normaal en verdwijnt spontaan na enkele dagen
- Dagelijkse wondcontrole, hou het verband droog. De waterdichte verbandjes moeten gedurende 7 dagen op de wonde blijven.
- Komt het verband toch los, breng dan lokaal ontsmettingsmiddel aan op de wonde (bv. hibidil®) en kleef een nieuw verbandje. (U krijgt eventueel reserve verbandjes mee naar huis)
- De hechtingen verteren vanzelf na 3-6 weken

## VOEDING

- Op de dag van de operatie licht verteerbare voeding.

## AANDACHTSPUNTEN

- U wordt opgebeld de dag na de operatie door een verpleegkundige.
- Bij een van de volgende signalen moet u meteen een arts raadplegen: pijn bij het plassen of moeilijk plassen, hoge koorts, bloeden.
- Uw kind moet op controle komen, na afspraak met de arts.