



Secretariaat kinderartsen
9u-13u en 14u-17u
pediatrie@ziekenhuiswaregem.be
056/62 35 50

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150- B-8790 Waregem
T 056/62 31 11 – F 056/62 30 20
info@ziekenhuiswaregem.be
www.ziekenhuiswaregem.be



Aerosol



Omdat uw kindje een piepende ademhaling heeft, werd door de dokter een behandeling met aërosol voorgeschreven.

Bij een aërosol wordt de voorgeschreven medicatie door verneveling (of verstuiving) toegediend met behulp van een aërosolmasker en een aërosoltoestel.

Het aërosolmasker met reservoir wordt steeds aangekocht en is persoonlijk.

Het aërosoltoestel kan gehuurd worden bij een apotheek, of bij de mutualiteit indien nodig voor een langere periode.

Wat heb je nodig om aërosol toe te dienen?

- Aërosolmasker met reservoir
- Verbindingsleiding
- Aërosoltoestel
- Stopcontact
- Medicatie
- Propere katoenen doek



Wanneer geef je best de aërosol?

Na een aërosol hoest je kind de losgekomen slijmpjes op en dit kan braken tot gevolg hebben. Daarom geef je best de aërosol vóór de voeding.

Wanneer je kindje echter héél hongerig is, geef je beter eerst de fles, anders geraakt het kind te overstuur of te moe om te drinken na de aërosol.

Hoe ga je te werk?

- Was je handen
- Controleer of het aërosolreservoir proper en droog is, er mogen géén waterdruppels meer inzitten
- Druppel de medicatie in het aërosolreservoir zoals voorgeschreven werd door de arts

medicatie	Dosis	Aantal keer per dag
Atrovent 0.25 mg/2 ml		
Fysiologisch		
Ventolin druppels		
Budesonide 0,5 mg/ 1 ml		

- Je mag bovenstaande aerosol ----- keer per dag geven
- Draai het masker op het potje en verbind dit met het toestel
- Let op: hou het potje met masker steeds recht, anders gaat de medicatie verloren
- Zet je kind in een comfortabele, rechtzittende houding of neem je kind op de schoot
- Hou het masker voor de neus en mond van je kind en zet dan het toestel aan. Je kindje mag een fopspeen in de mond houden tijdens de toediening van de aërosol.
- Het toestel verstuift de medicatie gedurende een 10-tal minuten of tot het potje/reservoir leeg is.

- Tussendoor mag u het aërosolreservoir lichtjes schudden zodat de druppels medicatie tegen de rand terug in het potje vallen.
- Laat uw kind na de aërosol met Budesonide een slokje water drinken.
- Spoel na de aërosol het masker, het potje en de vlotter uit met zeer warm water
- Laat alles drogen aan de lucht in een propere katoenen doek (zijkant open) die je dagelijks vervangt.



Hou steeds wat speelgoed of boekjes bij de hand om je kindje af te leiden tijdens de aërosol.



Een ritueel met een rustgevend muziekje of een kinder-DVD kan ook helpen



Stel je kind gerust. Zeg dat het geen pijn doet en je kindje beter gaat maken.



Zacht zingen en wiegen kunnen wonderen doen om je kindje rustig te houden.



Bij verdere vragen contacteer uw huisarts of kinderarts (056/62 35 50).